

PROVA SCRITTA N.°1

Il sig. Alberto, di anni 80, affetto da morbo di Parkinson, viene dimesso dal reparto di Geriatria dopo posizionamento di PEG (Gastrostomia endoscopica percutanea) con mobilità limitata a letto e poltrona. Questo signore vive con la moglie anziana ed è accudito da una badante. E' in terapia con Levodopa/Carbidopa da 250/25 mg. 1 compressa per 3 volte al dì. L'infermiere del reparto, in vista della dimissione, spiega alla moglie e alla badante come somministrare il pasto Nutrison Protein 500 ml per 2 volte al dì, 1000 ml. di acqua e la terapia attraverso la sonda gastrica.

1. In che cosa consiste la Gastrostomia endoscopica percutanea?

2. L'indicazione al suo confezionamento è data da un periodo di trattamento nutrizionale enterale che deve essere superiore a quante settimane? _____

3. Inserisci negli spazi liberi gli elementi mancanti:

Il pasto deve essere infuso in modalità _____.
Il farmaco Levodopa/Carbidopa va somministrato a stomaco _____.
La durata di infusione del singolo flacone di Nutrison Protein deve essere indicativamente di _____ ore.

Il sig. Alberto viene seguito dall'infermiere dell'ADI, che al 1° accesso dopo 48 ore dalla dimissione si accorge che la pervietà della sonda è compromessa.

4. Per ripristinare il funzionamento della sonda gastrica:

che tipo di siringa si utilizza? _____
Come viene definita la tecnica di lavaggio della sonda? _____
L'acqua utilizzata per il lavaggio a quale temperatura dev'essere? _____
Se l'ostruzione non si risolve si può procedere con la somministrazione di sostanze a base di che cosa? _____

A distanza di 2 mesi dalla dimissione, le condizioni generali del sig. Alberto peggiorano. Subentra un'incontinenza urinaria e l'infermiere alla visita domiciliare di controllo rileva la presenza a livello sacrale di una lesione a margini frastagliati che coinvolge il derma. Il letto della lesione presenta tessuto di granulazione, è scarsamente essudante con assenza di sottominatura.



5. Descrivi brevemente il meccanismo fisiopatologico con cui si instaura una lesione da pressione.

Classifica lo stadio della lesione del sig. Alberto

6. Per una corretta detersione della lesione che tipo di soluzione si utilizza?

Quale medicazione è indicata utilizzare secondo le linee guida NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel)?

Il paziente rimane per molte ore seduto in poltrona.

7. Quali punti vanno monitorati per prevenire il rischio di ulteriori lesioni?

8. Quale presidio è indicato per gestire l'incontinenza urinaria del sig. Alberto?

