

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
4 posti di Cps Infermiere cat. D
di cui n. 1 posto riservato a volontario delle FF.AA.

PROVA PRATICA C

APPORRE QUI IL
CODICE A BARRE

ETICHETTA
CANDIDATO

1) **Scegli la "sequenza" più corretta per effettuare il trattamento di una ferita lacero-contusa all'avambraccio dx, di persona adulta, che accede alla saletta visita di Pronto Soccorso:**

1. Indossare guanti m.u. e procedere al lavaggio della ferita.
2. Eseguire toelettatura della ferita, (collaborare con il Medico per eventuale sutura della ferita).
3. Previo prescrizione Medica, eseguire profilassi antitetanica.
4. Indossare guanti sterili ed eseguire antisepsi della ferita.
5. Accogliere, tranquillizzare il paziente e farlo accomodare sul lettino visita.
6. Ispezionare visivamente la ferita, rimuovere guanti m.u., lavarsi le mani.
7. Predisporre il materiale per un'accurata detersione o lavaggio della stessa.
8. Lavarsi le mani ed indossare guanti m.u., liberare l'arto ferito dagli indumenti ancora presenti.
9. Confezionare medicazione e bendaggio finale di protezione della ferita.
10. Rimuovere i guanti m.u., lavarsi le mani e predisporre il materiale per antisepsi della ferita.

1) A) 5 - 8 - 6 - 7 - 1 - 10 - 4 - 2 - 9 - 3

B) 5 - 7 - 6 - 1 - 8 - 10 - 2 - 9 - 3 - 4

C) 5 - 6 - 8 - 10 - 1 - 7 - 3 - 4 - 2 - 9

2) Scegli la "sequenza" più corretta per effettuare la pratica del prelievo di sangue venoso periferico al paziente:

1. Chiedo se ha mangiato, assunto terapia e se ha preferenza di scelta del braccio.
2. Rimuovo la provetta dalla campana, ruoto delicatamente la provetta stessa, rimuovo il laccio dal braccio e rimuovo l'accesso venoso tamponando il sito di prelievo con tampone di ovatta.
3. Pungo la cute usando il presidio più idoneo (becco di clarino rivolto verso l'alto).
4. Saluto, mi presento, identifico attivamente ed informo il paziente della procedura, quindi garantisco la sua privacy.
5. Posiziono il paziente semiseduto o sdraiato, scopro avambraccio e verifico idoneità dell'arto, quindi posiziono telino sotto l'arto.
6. Rimuovo i guanti, registro la procedura, saluto il paziente ed invio le provette in laboratorio.
7. Controllo della prescrizione medica.
8. Rimuovo il telino di protezione, sistemo il paziente in posizione confortevole e smaltisco il materiale usato.
9. Indosso i dispositivi di protezione individuali, posiziono il laccio, individuo la vena, disinfetto il sito di venipuntura.
10. Inserisco la provetta al vacutainer lascio riempire sino al livello desiderato.

- A) 4 - 5 - 3 - 1 - 2 - 10 - 6 - 9 - 7 - 8**
- B) 7 - 1 - 4 - 9 - 6 - 2 - 10 - 3 - 8 - 5**
- C) 7 - 4 - 1 - 5 - 9 - 3 - 10 - 2 - 8 - 6**

3) Scegli la "sequenza" più corretta per praticare un enteroclisma:

1. Eliminare l'aria dal tubo di raccordo.
2. Preparare il carrello con tutto il materiale necessario.
3. Lubrificare la sonda ed inserirla nel retto.
4. Informare il paziente della pratica a cui verrà sottoposto e garantirne la privacy.
5. Riempire il contenitore con la soluzione prescritta.
6. Agganciare l'apparecchio all'apposito sostegno.
7. Lavare le mani ed indossare i guanti monouso.
8. Far assumere al paziente la posizione di decubito laterale sinistro.
9. Raccordare la sonda rettale al tubo.
10. Lasciare defluire la soluzione.
11. Rimuovere la sonda.

- A) 2 - 4 - 7 - 5 - 6 - 1 - 8 - 3 - 9 - 10 - 11**
- B) 7 - 2 - 4 - 6 - 8 - 5 - 9 - 3 - 1 - 11 - 10**
- C) 2 - 7 - 4 - 8 - 1 - 5 - 9 - 3 - 10 - 6 - 11**