



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D


PROVA 5

NON STRAPPARE
L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA

I quesiti della prova sono stati forniti dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

Codice questionario



1 La rachicentesi può essere un esame utile per la diagnosi di:

- A** morbo di Parkinson
- B** emorragia cerebrale intraparenchimale
- C** stroke ischemico
- D** emorragia subaracnoidea

2 Una soluzione che presenta pH = 7,4 (il pH normale del sangue) si deve definire:

- A** debolmente basica
- B** neutra
- C** debolmente acida
- D** fortemente acida

3 Il massaggio carotideo provoca:

- A** aumento della frequenza cardiaca
- B** riduzione della frequenza respiratoria
- C** riduzione dello spasmo del muscolo sternocleidomastoideo
- D** riduzione della frequenza cardiaca

4 Secondo la Costituzione Italiana, la salute è:

- A** un bene disponibile
- B** diritto dell'individuo e delle formazioni sociali a cui il singolo partecipa
- C** obbligatoria e gratuita
- D** fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

5 Una lesione da decubito al primo stadio prevede:

- A** un eritema fisso
- B** una lesione di diametro inferiore ai 5 cm
- C** la rimozione solo dell'epidermide
- D** un eritema reattivo

6 Il pneumotorace spontaneo è costituito da presenza di:

- A** gas nella cavità pleurica
- B** liquidi nelle cavità alveolari
- C** gas nella cavità mediastinica
- D** pus nella cavità pleurica

7 Quale tra i seguenti segni e sintomi NON caratterizza la flebite?

- A** Area calda al tatto
- B** Dolore lungo la vena
- C** Edema del punto di inserzione
- D** Assenza di reflusso di sangue mettendo il flacone della flebo, collegata con un deflussore all'agocannula, al di sotto del piano di appoggio del paziente

8 Il sistema di isolamento basato sulle precauzioni universali richiede:

- A** l'utilizzo di misure di barriera ogni qualvolta si entri in contatto con il paziente
- B** l'isolamento immediato e stretto dei pazienti sintomatici
- C** l'isolamento del paziente in stanza singola
- D** di considerare tutti i pazienti potenzialmente infetti per le malattie che si trasmettono attraverso il sangue e altri liquidi biologici

9 Il test di Coombs diretto è un esame:

- A** utile a valutare il tasso di bilirubina nel sangue
- B** che mette in evidenza l'anemia sideropenica
- C** utile a dimostrare la presenza di anticorpi adesi alle emazie
- D** che mette in evidenza la capacità di un farmaco di provocare emolisi nell'organismo

10 Il questionario, a differenza dell'intervista, è generalmente preferito:

- A** quando lo scopo della ricerca è descrivere o correlare tra loro variabili ben definite
- B** quando lo scopo della ricerca è sperimentare l'efficacia di un trattamento
- C** quando lo scopo della ricerca è studiare variabili qualitative ancora da scoprire o da definire
- D** quando lo scopo della ricerca è esplorare un nuovo farmaco

11 È definita anisocoria:

- A** una disuguaglianza del diametro pupillare
- B** l'assenza del riflesso fotomotore
- C** un aumento del diametro pupillare (superiore a 5 mm)
- D** una riduzione del diametro pupillare (inferiore a 2 mm)

12 Può essere definita empiema:

- A** una raccolta di pus nella cavità peritoneale
- B** una raccolta di pus nella cavità pelvica
- C** una raccolta di pus nel polmone
- D** una raccolta di sangue nella cavità pelvica

13 È definita "incontinenza urinaria riflessa":

- A** una perdita urinaria involontaria che si verifica quando è stato raggiunto un volume vescicale specifico
- B** l'improvvisa e involontaria perdita di una piccola quantità di urina che accompagna un improvviso aumento della pressione addominale
- C** la perdita involontaria di urina, subito dopo aver avvertito il bisogno di urinare
- D** la continua, involontaria e imprevedibile perdita di urina

14 Nella fase dell'accertamento, l'ispezione è riferita:

- A** all'esame fisico e psichico
- B** all'esame visivo, alla palpazione, all'auscultazione e alla percussione
- C** all'esame visivo, alla palpazione, all'auscultazione, alla percussione e all'intervista
- D** al solo esame visivo

- 15** La pressione venosa centrale subisce incrementi nel caso di:
A trombosi venosa profonda
B cuore polmonare acuto
C riduzione della volemia
D shock settico
- 16** Le tre parole che ricorrono con frequenza nel Codice deontologico dell'infermiere, e ne rappresentano il senso generale, sono:
A responsabilità, attività e competenza
B prevenzione, cura e riabilitazione
C libertà, salute, dignità
D autonomia, formazione, conoscenza
- 17** Il principio dell'affidamento riguarda il rapporto tra:
A sanitario e sanitario
B malato e struttura ospedaliera
C malato e medico
D malato e parenti in caso di incapacità di esprimere libera volontà
- 18** Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:
A solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
B nell'assistenza di tutti i pazienti
C nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
D solo nei pazienti con sospetta patologia a trasmissione ematica
- 19** Lo strumentario endoscopico si sterilizza con:
A acido peracetico
B autoclave
C ipoclorito di sodio
D clorexidina 10%
- 20** Per la raccolta di quale dei seguenti materiali biologici NON è necessario l'uso di contenitori sterili, dovendo compiere su di essi l'esame colturale?
A Liquido cefalorachidiano
B Urina
C Sangue
D Feci
- 21** Il corredo cromosomico caratteristico della specie umana è composto da:
A 46 cromosomi più XX
B 23 cromosomi
C 22 coppie di cromosomi più i cromosomi sessuali
D 23 coppie di cromosomi più i cromosomi sessuali
- 22** È considerato normale un indice di Apgar compreso tra:
A 7 - 10 punti
B 0 - 3 punti
C 4 - 7 punti
D 10 - 12 punti
- 23** Qual è il volume massimo di liquido che può essere somministrato tramite iniezione intramuscolare nella sede ventrogluteale?
A 7 ml
B 3 ml
C 9 ml
D 5 ml
- 24** Gli esami più significativi per la diagnosi di pancreatite sono:
A amilasi e lipasi
B elettroliti sierici ed urinari
C calcemia e lipasi
D amilasi e bilirubina
- 25** Quale delle seguenti procedure va eseguita per prima in caso di politrauma?
A Proteggere dall'ipotermia
B Proteggere la colonna cervicale e le vie respiratorie
C Controllare lo stato emodinamico
D Garantire un'adeguata ventilazione
- 26** Gli ormoni che esercitano un maggior controllo sulla concentrazione extracellulare di potassio sono:
A l'insulina e l'aldosterone
B l'ACTH e l'ormone paratiroideo
C l'insulina e l'ormone paratiroideo
D l'insulina e l'ACTH
- 27** Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:
A prima di applicare un catetere vescicale in ambito ospedaliero
B prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente
C nessuna delle altre alternative è corretta
D prima della preparazione del materiale sterile per un intervento chirurgico
- 28** I farmaci antelmintici sono impiegati:
A nel trattamento delle parassitosi intestinali
B per contrastare il vomito
C per la regolarizzazione della secrezione biliare
D per trattare l'accumulo di metalli pesanti nel sangue
- 29** Nel caso si utilizzi un deflussore che eroga 10 gocce per 1 ml, per regolare la velocità di infusione allo scopo di somministrare 1 litro di soluzione in circa 8 ore, occorre regolare il deflussore in modo che si somministrino:
A 15 gocce al minuto
B nessuna delle altre alternative è corretta
C 10 gocce al minuto
D 25 gocce al minuto

30 Per atelectasia si intende:

- A** un quadro non uniforme di dilatazione anormale permanente degli spazi d'aria distalmente ai bronchioli terminali con distruzione dei setti alveolari
- B** la lesione necrotica localizzata del parenchima polmonare contenente materiale purulento
- C** il collasso di un alveolo, di un lobo o di una più ampia porzione polmonare
- D** la dilatazione cronica dei bronchi e dei bronchioli



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =