

SELEZIONE DEL 11/10/2018

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 5 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE CAT. "D"

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione:

per la domanda aperta:

- *aderenza della trattazione alla domanda*
- *chiarezza e correttezza espositiva*
- *capacità di sintesi nella risposta*
- *identificazione ed esposizione esaustiva dei concetti chiave.*

per i quiz:

corretta indicazione della risposta esatta (in grassetto le risposte esatte):

PROVA SCRITTA N. 1

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.

| | |
|-----------|--|
| 1) | Il dolo si caratterizza per: |
| a) | Volontarietà della condotta offensiva |
| b) | Ignoranza di leggi, regolamenti, discipline |
| c) | Imperizia nello svolgere un atto |
| d) | Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline |
| 2) | Il contropulsatore aortico viene usato: |
| a) | Nello shock cardiogeno |
| b) | Nella dissezione aortica |
| c) | Nell'insufficienza aortica grave |
| d) | Nell'insufficienza tricuspидale |
| 3) | Nelle fasi precoci di un'occlusione intestinale meccanica del colon il quadro clinico è contraddistinto da: |
| a) | Vomito fecaloide |
| b) | Febbre suppurativa |
| c) | Dolori addominali di tipo crampiforme |
| d) | Peristalsi assente |
| 4) | Il confondimento è: |
| a) | L'associazione tra l'esposizione a una malattia e un fattore esterno |
| b) | La distorsione nella stima dell'effetto di un'esposizione su un esito |
| c) | Un fattore di rischio che confonde l'esito di una diagnosi |
| d) | Un errore nella procedura diagnostica |
| 5) | La soluzione di Sodio Cloruro 0,9% è: |
| a) | Isotonica |
| b) | Ipotonica |
| c) | Ipertonica |
| d) | Nessuna delle precedenti |

Il candidato illustri quali sono gli elementi che caratterizzano le fasi della pianificazione degli interventi nel processo di assistenza infermieristica.

PROVA SCRITTA N. 2 (PROVA SORTEGGIATA)

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.

| | |
|-----------|--|
| 1) | Secondo la normativa vigente per accreditamento si intende: |
| a) | L'adozione di un sistema di pagamento a tariffe predeterminate |
| b) | La registrazione di tutte le prestazioni erogate |
| c) | Il possesso di requisiti predeterminati |
| d) | Tutte le precedenti risposte indicate |
| 2) | Nella respirazione, si definisce volume corrente la quantità di aria: |
| a) | Inspirata |
| b) | Espirata |

SELEZIONE DEL 11/10/2018

| | | |
|-----------|----|---|
| | c) | Che può essere espirata con una espirazione forzata |
| | d) | Che si inspira e si espira durante un atto respiratorio normale |
| 3) | | Oliguria ipertonica, acidosi metabolica, iperkaliemia, configurano il quadro clinico-laboratoristico: |
| | a) | Del diabete mellito scompensato |
| | b) | Del diabete insipido |
| | c) | Dell'epatite C |
| | d) | Della fase funzionale dell'insufficienza renale acuta |
| 4) | | La Cochrane Collaboration è: |
| | a) | Una rete internazionale di strutture ospedaliere |
| | b) | Una rete di enti di ricerca che si occupa principalmente di revisioni sistematiche degli studi inerenti l'assistenza sanitaria |
| | c) | Un'istituzione internazionale di consulenza e di governo della Sanità |
| | d) | Un'associazione professionale italiana multidisciplinare avente lo scopo di finanziare progetti di ricerca clinica |
| 5) | | Normalmente l'infusione di Mannitolo provoca: |
| | a) | Aumento dei valori pressori |
| | b) | Aumento della diuresi |
| | c) | Diminuzione del riflesso della tosse |
| | d) | Nessuna delle precedenti risposte è corretta |

Il candidato illustri il ruolo dell'infermiere nella prevenzione degli errori legati alla somministrazione della terapia farmacologica.

PROVA SCRITTA N. 3

| | | |
|---|----|--|
| Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz. | | |
| 1) | | L'obbligo della formazione permanente (ECM) per il mantenimento dell'adeguatezza professionale è stato introdotto con il: |
| | a) | D.Lgs. n. 502/1992, che riforma la pubblica amministrazione |
| | b) | D.M. n.70/1997, che detta il profilo professionale dell'infermiere pediatrico |
| | c) | D.Lgs. n. 229/1999, che introduce norme per la razionalizzazione del SSN |
| | d) | Nessuna delle precedenti risposte |
| 2) | | Le immunoglobuline che indicano un'infezione in atto sono: |
| | a) | IgE |
| | b) | IgA |
| | c) | IgD |
| | d) | IgG |
| 3) | | La causa principale di ostruzione delle vie aeree nel paziente privo di coscienza è: |
| | a) | La flessione dell'epiglottide |
| | b) | La caduta della lingua all'indietro |
| | c) | Il broncospasmo |
| | d) | Il collasso da trachea |
| 4) | | Gli strumenti per orientare le scelte assistenziali degli operatori prendono il nome di: |
| | a) | Livelli Essenziali di Assistenza |
| | b) | Linee Guida |
| | c) | Procedure Standard |
| | d) | Tecniche di Nursing |
| 5) | | Quali tra i seguenti non è un effetto dei farmaci betabloccanti sul sistema cardiovascolare: |
| | a) | Riduzione della pressione |
| | b) | Riduzione delle extrasistoli ventricolari |
| | c) | Effetto cronotropo negativo |
| | d) | Rallentamento della conduzione atrio-ventricolare |

Il candidato illustri il ruolo dell'infermiere nella prevenzione delle infezioni del sito chirurgico.

SELEZIONE DEL 11/10/2018

PROVA PRATICA N.1

| | |
|---|--|
| Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz. | |
| 1) | Per sanificazione si intendono le metodiche atte a: |
| a) | Controllare periodicamente la diffusione delle infezioni correlate all'assistenza |
| b) | Ridurre periodicamente la carica batterica |
| c) | Ridurre la carica batterica entro limiti di sicurezza con l'uso di detergenti |
| d) | Modificare la carica batterica transitoria |
| 2) | Prima di iniziare la rianimazione cardiopolmonare è necessario: |
| a) | Reperire un accesso venoso |
| b) | Chiamare il medico |
| c) | Valutare l'assenza di polso e attività respiratoria |
| d) | Trovare la collaborazione di un altro operatore |
| 3) | In un paziente operato all'addome, se si verifica una distensione addominale, quale intervento deve essere evitato: |
| a) | Favorire la mobilizzazione precoce |
| b) | Controllare le caratteristiche del respiro |
| c) | Monitorare la comparsa di rumori intestinali |
| d) | Mantenere il paziente a letto sino alla ricomparsa della peristalsi intestinale |
| 4) | I cateteri utilizzati per l'esecuzione del cateterismo intermittente possono essere distinti in quattro categorie. Indicare una risposta che non riporta una di esse: |
| a) | Semplice, con gel fornito separatamente |
| b) | Ricoperti da uno strato di gel |
| c) | Autolubrificanti idrofili |
| d) | Rigidi con gel a parte |

Il candidato illustri le modalità di valutazione del dolore nel paziente anziano.

PROVA PRATICA N.2

| | |
|---|--|
| Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz. | |
| 1) | La sterilizzazione è la: |
| a) | Completa distruzione o rimozione di microrganismi e delle loro spore dai materiali |
| b) | Rimozione dalla superficie di un oggetto di materiale chimico contaminante |
| c) | Completa distruzione dei batteri, dei virus, dei miceti, ma non necessariamente delle loro spore |
| d) | Rimozione dalla superficie di un oggetto di microrganismi e di materiali biologici pericolosi |
| 2) | In un paziente sottoposto a biopsia epatica è importante monitorare la comparsa di: |
| a) | Vomito |
| b) | Dispnea |
| c) | Incontinenza urinaria |
| d) | Apnea |
| 3) | Quale tra le seguenti pratiche riduce il rischio di complicanze tromboemboliche in un paziente operato: |
| a) | Fare indossare al paziente calze elastiche sia di giorno che di notte |
| b) | Fare alzare precocemente il paziente da letto e fargli praticare esercizi agli arti inferiori |
| c) | Fare svolgere esercizi passivi agli arti inferiori ogni giorno per almeno una settimana mantenendo il paziente a letto |
| d) | Mantenere il paziente a letto con gli arti sollevati |
| 4) | Quale dei seguenti interventi non è indicato se durante l'alimentazione attraverso sondino si manifesta vomito: |
| a) | Posizionare il paziente seduto |
| b) | Aspirare immediatamente dal sondino |
| c) | Valutare la concentrazione, la quantità e la velocità di alimento somministrato |
| d) | Rimuovere immediatamente il sondino |

Il candidato illustri le modalità di gestione di una colostomia.

SELEZIONE DEL 11/10/2018

PROVA PRATICA N.3 (PROVA SORTEGGIATA)

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.

| | |
|-----------|---|
| 1) | Il lavaggio delle mani mira specificatamente a prevenire: |
| a) | La trasmissione di tutti gli agenti virali |
| b) | La trasmissione di agenti virali trasmessi attraverso il sangue ed altri liquidi biologici |
| c) | Le infezioni correlate all'assistenza |
| d) | La trasmissione delle malattie infettive ematologiche |
| 2) | In caso di fibrillazione ventricolare, la defibrillazione elettrica va eseguita: |
| a) | Dopo incanalazione di una vena |
| b) | Dopo un tentativo di defibrillazione farmacologica con Lidocaina |
| c) | Dopo aver intubato il paziente |
| d) | Immediatamente |
| 3) | Ad un paziente affetto da ernia iatale è giusto raccomandare di: |
| a) | Fare pasti non troppo abbondanti e coricarsi dopo ogni pasto |
| b) | Fare pasti ricchi di grassi e passeggiare dopo ogni pasto |
| c) | Fare pasti piccoli e frequenti e non coricarsi subito dopo |
| d) | Bere molto durante la giornata e dormire senza cuscino |
| 4) | Quale tra le seguenti scale viene utilizzata per la valutazione dell'intensità del dolore: |
| a) | Visual Analogue Scale (VAS) |
| b) | Katz Index Test |
| c) | Functional Independence Measure (FIM) |
| d) | Test di stadiazione secondo Hoen e Yahr |

Il candidato illustri le modalità di esecuzione della broncoaspirazione in un paziente intubato.