

Prova C

1. La somministrazione di eparina sodica:
 - a. È controindicata in pazienti gravide in quanto è in grado di oltrepassare la placenta
 - b. Per via sottocutanea inizia ad agire dopo circa due ore**
 - c. E' possibile anche per via orale
 - d. E' sconsigliata nel periodo dell'allattamento, in quanto viene secreta nel latte materno

2. L'uso terapeutico della tossina botulinica è indicato:
 - a. Bruxismo
 - b. Blefarospasmo**
 - c. Distonia
 - d. Spasticità

3. I calcio antagonisti:
 - a. Stimolano i canali del calcio
 - b. Bloccano i canali del calcio**
 - c. Bloccano i canali del sodio
 - d. Stimolano i canali del sodio

4. Come si definiscono i rifiuti ospedalieri:
 - a. Velenosi
 - b. Umidi
 - c. Tossici
 - d. Speciali**

5. Che cosa s'intende per antisepsi:
 - a. Sterilizzazione di tessuti vegetali
 - b. Sterilizzazione di strumentario chirurgico
 - c. Disinfezione di tessuti viventi**
 - d. Disinfezione della sala operatoria

6. La clorexidina è un disinfettante che agisce:
 - a. Sui batteri gram – positivi e gram – negativi, sui miceti, sulle spore e sui virus
 - b. Sui miceti, sulle spore e sui virus
 - c. Sui batteri, gram – positivi e sui virus
 - d. Sui miceti e sui batteri gram – positivi e gram – negativi**

7. Quale di questi sintomi non si osserva nella ipertensione portale:
 - a. Leucopenia
 - b. Splenomegalia
 - c. Poliglobulia**
 - d. Ascite

8. L'edema è caratteristico della sindrome:
 - a. Immunodeficienza acquisita

- b. Paraneoplastica
- c. Nefrosica**
- d. Immunoricostituzione

9. I muscoli papillari e le corde tendinee sono preposti al funzionamento:

- a. Della valvola semilunare polmonare
- b. Del cardias
- c. Del piloro
- d. Della valvola mitrale**

10. L'essudato è:

- a. Liquido infiammatorio di provenienza plasmatica**
- b. Pus
- c. Fibrina
- d. Liquido che ha un'origine idrodinamica

11. In età senile l'assorbimento dei farmaci:

- a. Non varia per quanto riguarda la somministrazione intramuscolare
- b. Varia per quanto riguarda la somministrazione sottocutanea**
- c. È uguale all'assorbimento di un adulto
- d. Varia per tutte le vie di somministrazione

12. L'aneurisma dell'aorta addominale nell'anziano è causato, in genere, da:

- a. Aterosclerosi**
- b. Trauma
- c. Angina pectoris
- d. Embolia polmonare

13. La malrotazione intestinale predispone a:

- a. Pancreatite acuta
- b. Morbo di Crohn
- c. Occlusione intestinale**
- d. Diverticolite

14. Quale tra le seguenti non è una complicanza tipica dell'ernia:

- a. Strozzamento
- b. Intasamento
- c. Fistolizzazione**
- d. Irriducibilità

15. Cosa s'intende per Dumping Syndrom:

- a. Il risultato dell'incapacità dello stomaco di regolare il proprio svuotamento, tipicamente a seguito di interventi resettivi**
- b. Il risultato dell'incapacità della tiroide di secernere ormoni
- c. La sindrome postintervento di posizionamento di endoprotesi aortica, che genera sbalzi della termoregolazione

d. Lo stato comatoso tipico in un paziente che presenta ipertensione endocranica

16. Quale tra questi non è sintomo caratteristico del pneumotorace:

- a. Dispnea
- b. Febbre**
- c. Alterazioni respiratorie
- d. Alterazioni circolatorie

17. Si definisce idronefrosi:

- a. L'infiammazione dei calici renali
- b. La mancanza congenita di un uretere
- c. La dilatazione della pelvi e dei calici renali**
- d. L'ostruzione di un uretere

18. Si parla di patologia del secondamento dopo quanto dal parto:

- a. 10 – 20 minuti
- b. 30 – 60 minuti**
- c. 80 – 150 minuti
- d. 24 ore

19. Quale tra queste patologie rappresenta la prima causa di disidratazione in età pediatrica:

- a. Pancreatite
- b. Sindrome nefrosica
- c. Diabete mellito
- d. Gastroenterite**

20. Il diabete gestazionale:

- a. È una condizione di ipoglicemia individuata per la prima volta in gravidanza**
- b. Compare tipicamente prima dei trenta anni e si associa a deficit di secrezione insulinica
- c. Si associa frequentemente a basso peso fetale
- d. Compare tipicamente dopo i trenta anni e si associa a deficit di secrezione insulinica

21. Il riflesso di Moro indica:

- a. Un tipico "auto-abbraccio" del neonato**
- b. La capacità di rispondere a stimoli sonori
- c. La capacità di rispondere a stimoli visivi
- d. La capacità di rispondere al dolore

22. Quale fra i seguenti sintomi non è tipico della depressione:

- a. Disorganizzazione e frammentazione del pensiero**
- b. ipersonnia
- c. disforia
- d. affaticamento

23. La "sindrome delle gambe senza riposo" è:

- a. **L'insorgenza di mioclonie, parestesie e movimenti involontari degli arti inferiori che porta ad insonnia**
- b. La definizione Jacksoniana dell'ansia notturna
- c. Un effetto collaterale delle benzodiazepine
- d. Un effetto collaterale dei barbiturici

24. Un infermiere è tenuto ad effettuare un lavaggio antisettico delle mani:

- a. **Prima di procedure invasive**
- b. Dopo avere tolto i guanti
- c. Prima del contatto diretto con un paziente
- d. Dopo avere effettuato un prelievo di sangue ad un paziente

25. L'Unità Internazionale è:

- a. Centesima parte di 10 ml
- b. Decima parte di 1 ml
- c. Quarantesima parte di 1 ml
- d. **Centesima parte di 1 ml**

26. Nell'Elettrocardiogramma standard a 12 derivazioni, gli elettrodi precordiali sono:

- a. 12
- b. 8
- c. **6**
- d. 4

27. Le ustioni vengono distinte in tre gradi rispetto:

- a. All'estensione dell'ustione
- b. **Alla profondità dell'ustione**
- c. Al tempo di contatto
- d. Alla sostanza che ha causato il danno

28. In una persona con una lesione emisferica destra si può riscontrare:

- a. **Ipoestesia all'emisoma sinistro**
- b. Emiparesi destra
- c. Paresi totale
- d. Ipoastesia all'emisoma destro

29. Quale tipo di presidio permette l'erogazione fino al 90% di ossigeno:

- a. Maschera semplice
- b. Cannula (tubo nasale)
- c. Maschera di Venturi
- d. **Maschera con serbatoio**

30. In riferimento alla tecnica del prelievo capillare per l'emogluotest è indicato:

- a. Utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l'analisi
- b. **Eliminare la prima goccia di sangue e utilizzare la seconda per l'analisi**
- c. Pungere nella parte anteriore del polpastrello del dito

d. Pungere dopo avere accuratamente disinfettato con iodopovidone la zona da pungere