

## 2D

1. **Per una corretta compilazione del registro di carico/scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope è consentito l'utilizzo di...** **1**
  - 1) penna indelebile, in caso di errore barrare con la penna sulla scritta (in modo da consentire la lettura sottostante) e controfirmare al fianco della correzione
  - 2) penna indelebile, in caso di errore si annulla la pagina riscrivendo la richiesta nella pagina successiva
  - 3) penna indelebile, in caso di errore si cancella in modo da eliminare la scritta sottostante
  - 4) penna indelebile, in caso di errore si cancella con bianchetto riscrivendo a fianco la richiesta corretta
  
2. **Quando cominciare l'alimentazione dopo il confezionamento di una PEG primo impianto?** **1**
  - 1) Dopo 24 ore, velocità 40 cc/h
  - 2) Dopo 12 ore, velocità 40 cc/h
  - 3) Dopo 8 ore, velocità 40 cc/h
  - 4) Nessuna delle precedenti
  
3. **L'aspirazione endotracheale...** **2**
  - 1) deve essere prolungata per almeno 25-30 secondi per avere la certezza della rimozione delle secrezioni
  - 2) non deve durare più di 10-15 secondi per non provocare effetti collaterali
  - 3) non deve avere durata inferiore a 20 secondi
  - 4) nessuna delle precedenti
  
4. **Le verifiche PAI secondo la normativa 514/2009 e s.m.i. deve essere fatta...** **3**
  - 1) ad ogni modifica delle condizioni generali dell'ospite
  - 2) semestralmente
  - 3) ad ogni modifica delle condizioni generali dell'ospite e/o semestralmente
  - 4) trimestralmente
  
5. **Cosa si intende per setticemia?** **1**
  - 1) Malattia sistemica da batteri
  - 2) Sindrome da infezioni da batteri gram- negativi o positivi
  - 3) Malattia sistemica da batteri con sintomi
  - 4) Tutti i precedenti
  
6. **La valutazione del rischio di caduta, avviene attraverso le scale...** **3**
  - 1) Glasgow, Rankin, Ramsey
  - 2) Likert, Guttman
  - 3) Tinetti, Conley, Morse
  - 4) Nutrition-score, Mini nutritional assessment
  
7. **Le cadute si possono distinguere in...** **4**
  - 1) caduta accidentale
  - 2) cadute fisiologiche imprevedibili
  - 3) cadute fisiologiche prevedibili
  - 4) tutte le precedenti
  
8. **Quali sono i fattori di rischio personale da Legionella in ambiente nosocomiale?** **1**
  - 1) Immuosoppressione di varie cause
  - 2) Malattie cardio respiratorie croniche
  - 3) Ipotiroidismo
  - 4) Diabete insipido
  
9. **Qual è la scala di rilevazione del dolore somministrabile al paziente con demenza in fase moderata?** **3**
  - 1) VAS
  - 2) NRS
  - 3) PAINAD
  - 4) Nessuna delle precedenti

## 2D

10. **Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di...** 1
- 1) cinque giorni
  - 2) tre giorni
  - 3) due giorni
  - 4) una settimana
11. **Quale delle seguenti procedure riveste maggiore importanza nella prevenzione delle infezioni ospedaliere?** 4
- 1) L'utilizzo dei flussi d'aria laminari
  - 2) La nebulizzazione
  - 3) L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti
  - 4) Il lavaggio delle mani
12. **In quali casi l'isolamento funzionale da infezione/colonizzazione sospetta o accertata da enterobatteri produttori di carbapenemasi non deve essere applicato?** 4
- 1) In un paziente autosufficiente ma non in grado di mantenere una appropriata igiene e controllo ambientale
  - 2) In un paziente, assistito da care giver non in grado di mantenere un appropriato controllo ambientale attraverso l'applicazione delle precauzioni
  - 3) Per droplet quando non è presente tra le unità di degenza nella stanza una distanza minima di 1.5 metri
  - 4) Tutte le precedenti
13. **Per valutare lo spettro più ampio possibile di BPSD nella persona affetta da demenza, quale tra le seguenti scale posso impiegare?** 3
- 1) BDI
  - 2) CDR
  - 3) UCLA - NPI
  - 4) CMAI
14. **Secondo la DGR 560/2015 la rete locale di cure palliative è composta da 4 nodi, quali?** 3
- 1) Domicilio, hospice, ospedale, strutture per anziani
  - 2) Ospedale, hospice, ambulatorio, dipartimento di emergenza
  - 3) Hospice, ospedale, ambulatorio, domicilio
  - 4) Nessuna delle precedenti
15. **I requisiti sostanziali e formali della documentazione sanitaria devono essere...** 1
- 1) veridicità, chiarezza, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora precisazione nome e cognome, firma, intellegibilità della grafia
  - 2) veridicità, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora precisazione nome e cognome, firma
  - 3) veridicità, chiarezza, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora precisazione nome e cognome, firma, intellegibilità della grafia, annotazioni postume
  - 4) veridicità, chiarezza, completezza, contestualità, indicazione di data e ora precisazione nome e cognome, firma, intellegibilità della grafia
16. **Le ulcere venose si manifestano con predilezione a livello del...** 2
- 1) lato laterale dell'estremità distale degli arti inferiori
  - 2) lato mediale dell'estremità distale degli arti inferiori
  - 3) polpaccio
  - 4) porzione antero-laterale degli arti inferiori
17. **Quale strumento chirurgico viene utilizzato per pulire un ulcera da decubito...** 4
- 1) pinze di Cocker
  - 2) bisturi
  - 3) forbici e pinze
  - 4) tutte le precedenti

## 2D

- 18. Nella definizione OMS delle cure palliative...** **4**
- 1) viene affermato il diritto all'eutanasia
  - 2) vi è una chiara definizione dell'obbligo di somministrazione di cure eziologiche sino alla fine della vita
  - 3) le cure sono a favore del paziente e del solo paziente.
  - 4) nessuna delle precedenti
- 19. La definizione di Demenza...** **2**
- 1) malattia della memoria
  - 2) sindrome che altera progressivamente, pensiero, linguaggio, personalità, comportamento che interferisce con gli atti quotidiani della vita
  - 3) sindrome da alterazione del ritmo sonno veglia
  - 4) tutti le risposte
- 20. Come si deve comportare l'infermiere nei confronti di un paziente in cui si sospetti una crisi ipoglicemica?** **3**
- 1) somministrare glucosio e chiamare un medico
  - 2) somministrare glucosio, controllare la glicemia e chiamare un medico
  - 3) controllare la glicemia, somministrare glucosio, e chiamare un medico
  - 4) chiamare un medico e non fare nulla fino al suo arrivo