

# QUESTIONARIO

# 4

## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO**



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura  
a tempo indeterminato di n. 50 posti di  
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Cat. D

**- Prova Preselettiva -**

### **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga  
dato il segnale di inizio della prova

#### **VERSIONE QUESTIONARIO**



**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**



## Questionario 04000006

**1. Qual è la complicanza più temuta della disfagia:**

- A. l'afasia
- B. l'ematemesi
- C. la melena
- D. l'aspirazione di cibo nelle vie aeree

**2. L'enfisema sottocutaneo:**

- A. è una complicanza tardiva di tracheotomia
- B. è una complicanza precoce di tracheotomia
- C. non è una complicanza di tracheotomia
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**3. Il delirium tremens può intercorrere nel corso di sindrome da astinenza da:**

- A. etanolo
- B. cocaina
- C. morfina
- D. anfetamine

**4. L'isoimmunizzazione in gravidanza da incompatibilità materno-fetale ABO o RH si determina:**

- A. per la produzione di antigeni materni in risposta a uno stimolo anticorpale conseguente a esposizione ad antigeni eritrocitari fetali generalmente del gruppo RH
- B. per la produzione di anticorpi materni in risposta a uno stimolo antigenico conseguente a esposizione ad antigeni eritrocitari fetali generalmente del gruppo RH
- C. per la produzione di antigeni materni in risposta a uno stimolo anticorpale conseguente a esposizione ad antigeni eritrocitari fetali generalmente del gruppo RH linfocitario
- D. per la produzione di anticorpi materni in risposta a uno stimolo antigenico conseguente a esposizione ad antigeni eritrocitari fetali generalmente del gruppo HLA-RH

**5. Quando il paziente è in posizione supina, potrebbero svilupparsi lesioni da pressione nelle seguenti zone:**

- A. sacro, ginocchio malleolo, gomito, orecchio
- B. cavo popliteo, scapole, torace
- C. nuca, sacro, scapole, talloni
- D. sacro, ginocchio, scapole, orecchio

**6. Quali di queste sostanze non ha effetti dimostrati sul metabolismo glicidico?**

- A. betabloccanti
- B. antibiotici
- C. tiazidici
- D. glitazonici

**7. La ritenzione acuta di urina rappresenta spesso una complicanza di:**

- A. shock
- B. insufficienza renale
- C. adenoma prostatico
- D. tutte le risposte sono corrette

**8. Il pneumotorace spontaneo è più frequentemente causato da:**

- A. tubercolosi
- B. trauma
- C. enfisema bolloso
- D. tumore mediastinico

**9. Il D.Lgs. 81/2008 si applica:**

- A. a tutti i settori dell'attività pubblica o privata
- B. solo alle forze di polizia
- C. alle rappresentanze diplomatiche e del pubblico esercizio in genere
- D. solo ai settori dell'attività pubblica

**10. Il paziente ipertiroideo presenta:**

- A. cute secca – sonnolenza - stipsi
- B. crampi muscolari – ipertensione arteriosa – flushes cutanei
- C. sete eccessiva – poliuria – eccesso ponderale
- D. tremori – insonnia – diarrea

**11. La febbre Tifoide viene trasmessa attraverso:**

- A. sistema tegumentario
- B. apparato gastrointestinale
- C. apparato respiratorio
- D. sistema circolatorio

**12. Le soluzioni tampone sono formate:**

- A. da un acido forte ed una base forte
- B. da due acidi deboli
- C. da un acido debole e un suo sale derivato da una base forte
- D. da un sale derivato da una base forte

**13. La bilirubina è resa solubile ed eliminabile nella bile per coniugazione con acido:**

- A. gliossilico
- B. ossalacetico
- C. glutammico
- D. glicuronico

**14. La figura dell'infermiere pediatrico in Italia:**

- A. è un ruolo ad esaurimento
- B. è regolata dalla legge n.1 del 2002
- C. è l'unica abilitata ad assistere i pazienti di età inferiore a 18 anni
- D. è regolata dal D.M.70/97

**15. L'insufficienza renale cronica:**

- A. è sempre reversibile
- B. non è reversibile
- C. è reversibile prima di iniziare le dialisi
- D. necessita sempre di trattamento dialitico

**16. Per fare diagnosi di primo livello bisogna sottoporsi a:**

- A. EEG
- B. audiometria
- C. timpanogramma
- D. potenziali evocati

**17. Il terzo stadio nella classificazione delle ulcere da decubito corrisponde a:**

- A. ulcera superficiale
- B. eritema persistente alla digitopressione
- C. perdita cutanea estesa con necrosi tissutale o danno muscolare-osseo
- D. danno-necrosi del sottocute non oltre la fascia muscolare

**18. Le verruche:**

- A. non sono contagiose
- B. sono determinate da un poxvirus
- C. sono frequenti sul dorso delle mani
- D. hanno lo strato malpighiano assottigliato

**19. La clearance della creatinina deve essere effettuata:**

- A. solo su un campione di sangue
- B. su un campione di urine delle 24 ore più uno di sangue prelevato dopo 12 ore
- C. su un campione di sangue più uno di urine delle 24 ore
- D. su un campione di urine delle 24 ore più uno di sangue prelevato dopo 8 ore

**20. L'auscultazione del torace posteriore è facilitata se il paziente assume una posizione:**

- A. prona
- B. seduta, con il busto inclinato in avanti e le braccia incrociate
- C. laterale con le braccia incrociate
- D. supina

**21. L'afasia sensoriale comporta la mancanza di:**

- A. comprensione della parola
- B. comprensione dei toni puri
- C. percezione spaziale
- D. memoria

**22. Dopo una trasfusione di sangue incompatibile il paziente presenta:**

- A. reazione emolitica
- B. emosiderosi
- C. complicanze infettive
- D. riduzione delle proteine plasmatiche

**23. La corretta esecuzione dell'esame per emocultura prevede:**

- A. il prelievo a digiuno
- B. due prelievi a distanza di 12 ore
- C. più prelievi in concomitanza con l'acme febbrile
- D. un prelievo a distanza di 12 ore dalla somministrazione dell'antibiotico

**24. In caso di peritonite, il liquido peritoneale appare:**

- A. ematico
- B. torbido
- C. trasparente
- D. giallo paglierino

**25. Il drenaggio posturale è:**

- A. il drenaggio delle secrezioni gastriche attraverso specifiche posizioni e con la forza di gravità
- B. la posizione del paziente per il drenaggio dei frammenti durante un intervento di litotriassia
- C. il drenaggio delle secrezioni dei vari segmenti polmonari attraverso specifiche posizioni e con la forza di gravità
- D. il decubito del paziente durante uno shock ipovolemico

**26. L'unità di misura dei Cateteri Venosi-centrali è solitamente espressa in:**

- A. US Gauge
- B. millimetre
- C. gamma
- D. French Gauge

**27. Quale dei seguenti interventi è da preferirsi per la buona cura del soggetto a rischio di lesione da pressione?**

- A. Porre accanto al letto del paziente il timing di cambio posizione
- B. far scivolare il paziente invece di sollevarlo quando lo si gira
- C. massaggiare ripetutamente le prominente ossee
- D. girare e riposizionare il paziente ad intervalli fissi di 8 ore

**28. Per ordinarie occupazioni si intende una delle seguenti definizioni. Quale?**

- A. le attività lavorative retribuite
- B. le attività lavorative esercitate continuamente
- C. le attività lavorative ed extra lavorative abituali e lecite
- D. le attività extra lavorative purchè esercitate continuamente

**29. Quale dei seguenti non è un organo costituzionale dello stato**

- A. Parlamento
- B. Consiglio dei ministri
- C. Provincia
- D. Presidente della Repubblica

**30. L'area geografica più popolata è:**

- A.** Asia orientale e isole del Pacifico
- B.** Europa
- C.** America latina
- D.** Medio Oriente e Nord Africa

**Domanda di Riserva**

**31. Per EBN s'intende:**

- A. l'eccellenza dell'infermieristica basata sulla consulenza di esperti
- B. l'Infermieristica basata sul risk management
- C. l'infermieristica basata sulle prove di efficacia
- D. l'infermieristica condivisa tra pari

