

Concorso pubblico a gestione condivisa dell'Area Ottimale del Levante per la copertura di n° 20 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – (CATEG. D) - da assegnare all'ASL 4 di Chiavari.

PROVA PRATICA N. 2

1) Scegli la "sequenza" più corretta per effettuare il trattamento di una ferita lacero-contusa all'avambraccio dx., di persona adulta, che accede alla saletta visita di Pronto Soccorso:

1. Indossare guanti m.u. e procedere al lavaggio della ferita
2. Eseguire toelettatura della ferita, (collaborare con il Medico per eventuale sutura della ferita)
3. Previa prescrizione Medica, eseguire profilassi antitetanica
4. Indossare guanti sterili ed eseguire antisepsi della ferita
5. Accogliere, tranquillizzare il paziente e farlo accomodare sul lettino visita
6. Ispezionare visivamente la ferita, rimuovere guanti m.u. , lavarsi le mani
7. Predisporre il materiale per un'accurata detersione o lavaggio della stessa
8. Lavarsi le mani ed indossare guanti m.u., liberare l'arto ferito dagli indumenti ancora presenti
9. Confezionare medicazione e bendaggio finale di protezione della ferita
10. Rimuovere i guanti m.u. , lavarsi le mani e predisporre il materiale per antisespsi della ferita

<input type="checkbox"/> A) 5 8 6 7 1 10 4 2 9 3
<input type="checkbox"/> B) 5 7 6 1 8 10 2 9 3 4
<input type="checkbox"/> C) 5 6 8 10 1 7 3 4 2 9

2) Scegli la “sequenza” più corretta per effettuare la somministrazione della terapia intramuscolare al paziente:

1. Identifico e valuto il sito di iniezione e posiziono il pz (prono o su un fianco con arto in scarico)
2. Riposiziono in modo confortevole il pz, smaltisco il materiale negli appositi contenitori e riordino
3. Eseguo manovra di lesser ed inietto lentamente il farmaco
4. Saluto, mi presento, identifico attivamente il pz., lo informo, valuto le condizioni generali e garantisco la privacy
5. Controllo della prescrizione medica e del farmaco (dosaggio, scadenza, integrità)
6. Eseguo tecnica a zeta con mano non dominante e con movimento a dardo introduco l'ago con angolatura di 90°
7. Rimuovo i guanti, lavaggio sociale delle mani e registrazione della procedura
8. Lavaggio sociale delle mani, aspiro il farmaco e cambio l'ago
9. Indosso i guanti monouso, disinfetto a virgola (2due volte) il sito di iniezione
10. Al termine, sfilo velocemente l'ago e comprimo lievemente il sito con tampone intriso di disinfettante.

<input type="checkbox"/> A)	5	4	8	6	9	1	10	2	3	7
<input type="checkbox"/> B)	5	8	4	1	9	6	3	10	2	7
<input type="checkbox"/> C)	5	1	8	4	6	9	3	7	2	10

3) Scegli la “sequenza” più corretta per eseguire una tricotomia pre-operatoria:

1. Ripulire l’area tricotomizzata con soluzione detergente al fine di eliminare eventuali residui di pelo
2. Fare indossare al paziente un camice pulito
3. Procedere alla rasatura
4. Verificare, nella documentazione clinica, quale area deve essere depilata in relazione al tipo di intervento chirurgico
5. Predisporre il materiale occorrente
6. Adottare le misure volte a garantire la privacy
7. Sciacquare accuratamente ed asciugare la cute
8. Lavarsi le mani ed indossare i guanti monouso
9. Detergere la zona interessata alla depilazione
10. Disinfettare l’aria della cute tricotomizzata

<input type="checkbox"/> A)	4	5	6	8	9	3	1	7	10	2
<input type="checkbox"/> B)	6	8	5	4	3	1	7	10	9	2
<input type="checkbox"/> C)	4	6	8	5	3	1	7	10	2	9