

QUESTIONARIO

F



ASST Sette Laghi

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N.3 POSTI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE, CAT.D.

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario 0009000001

1. **Stai assistendo un paziente con embolia polmonare e la prescrizione medica prevede che inizi un'infusione continua di Eparina a 750 UI/h. I protocolli operativi di reparto prevedono la diluizione di 1 fiala di Eparina da 25.000 UI/5ml fino a 50 ml con soluzione fisiologica. A quanti ml/h devi impostare la pompa siringa?**
- A. 1,5 ml/h
 - B. 2,0 ml/h
 - C. 2,5 ml/h
 - D. 1,75 ml/h
2. **Il protocollo per la somministrazione di eparina prevede l'infusione di una soluzione con concentrazione pari a 50.000 Unità / 50 ml. Se la velocità di infusione della soluzione è di 1 ml/ora, quante unità di eparina sono state somministrate dopo 10 ore.**
- A. 10.000 U
 - B. 1.000 U
 - C. 100.000 U
 - D. 5.000 U
3. **Quali sono le ipotesi in cui il legislatore richiama espressamente il segreto professionale?**
- A. Tutte le altre alternative proposte sono corrette
 - B. La tossicodipendenza e l'AIDS
 - C. La violenza sessuale e l'AIDS
 - D. La violenza sessuale e l'interruzione volontaria della gravidanza
4. **L'Articolo 24 del Codice Deontologico del 2009 recita: "L'infermiere aiuta e sostiene l'assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere." Stiamo parlando di:**
- A. Consenso informato
 - B. Capacità di interagire con il paziente
 - C. Piano clinico-assistenziale
 - D. Nessuna delle altre alternative proposte è corretta
5. **Il D.M. 739/94 è anche conosciuto come "profilo professionale" di quale delle seguenti figure sanitarie?**
- A. Nessuna delle altre alternative proposte è corretta
 - B. Dietista
 - C. Fisioterapista
 - D. Ostetrica
6. **In un reparto di chirurgia, durante la sorveglianza, trovi un paziente incosciente, collegato al monitor, con il seguente tracciato elettrocardiografico;**



- Quale serie di azioni, tra quelle descritte poni in essere:**
- A. Allertare team avanzato - chiedere defibrillatore semi-automatico e carrello emergenze - iniziare manovre di rianimazione cardio-polmonare - applicare il defibrillatore semi-automatico - supportare il team avanzato
 - B. Chiamare il medico reperibile - eseguire ECG a 12 derivazioni - iniziare manovre di rianimazione cardio-polmonare - inviare tracciato in cardiologia
 - C. Recuperare il defibrillatore semi-automatico e carrello emergenze - predisporre i farmaci - iniziare rianimazione cardio-polmonare
 - D. Chiamare il medico reperibile e collega in turno - iniziare ventilazione manuale - supportare team avanzato
7. **In un paziente in edema polmonare, quali dei seguenti farmaci fa parte di quelli prescritti abitualmente?**
- A. Furosemide
 - B. Beclometasone (aerosol)
 - C. Bolo di cristalloidi
 - D. Teofillina
8. **Il sig Rossi, diabetico ricoverato per scompenso cardiaco, manifesta i seguenti sintomi: sete - stimolo alla minzione - secchezza del cavo orale - mancanza di appetito - Quali delle seguenti valutazioni ritieni possa essere corretta:**
- A. Il paziente potrebbe essere in una condizione di iperglicemia
 - B. Il paziente potrebbe essere in una condizione di ipoglicemia
 - C. Il paziente potrebbe avere un sovraccarico del cuore destro
 - D. I segni e sintomi descritti non mi permettono alcuna valutazione

- 9. Stai controllando gli esami ematochimici del signor Bianchi che deve essere sottoposto ad un intervento di chirurgia addominale. Quale dei seguenti valori è opportuno riportare tempestivamente al chirurgo?**
- A. Creatininemia: 2,1 mg/dl
 - B. INR: 1,3
 - C. Emoglobina: 14,1 g/dl
 - D. Globuli rossi: 4,1 milioni/mm³
- 10. Se, in un paziente adulto di 70 kg di peso, il volume di urina emesso nelle 24 h è di 365 ml siamo di fronte a:**
- A. Oliguria
 - B. Anuria
 - C. Stranguria
 - D. Pollachiuria
- 11. Il rischio clinico può essere definito come ... :**
- A. La probabilità di un paziente di essere vittima di un evento avverso
 - B. La probabilità del medico di andare incontro ad un errore diagnostico e/o terapeutico
 - C. La probabilità del medico di non accertare "la diagnosi corretta"
 - D. Nessuna delle altre alternative proposte è corretta
- 12. Il GCS (Glasgow Coma Score) assume un punteggio minimo di ...**
- A. 3
 - B. 0
 - C. 7
 - D. 15
- 13. I centri nervosi che regolano la ventilazione si trovano a livello:**
- A. Del bulbo e del ponte
 - B. Della corteccia cerebrale
 - C. Del cervelletto
 - D. Del talamo
- 14. La cardioversione elettrica sincronizzata può essere indicata in caso di:**
- A. Flutter atriale
 - B. Fibrillazione ventricolare
 - C. Blocco A-V di II tipo Mobitz II
 - D. Tachicardia ventricolare senza polso
- 15. Il solfato di protamina trova impiego per neutralizzare la tossicità da:**
- A. Eparina
 - B. Adrenalina
 - C. Norepinefrina
 - D. Atropina
- 16. Nella prima fase del morbo di Alzheimer sono riscontrabili:**
- A. Difficoltà nell'imparare e ricordare informazioni nuove
 - B. Ripetitività delle azioni e irrequietezza
 - C. Disturbi dell'andatura
 - D. Difficoltà nell'esprimere giudizi e formulare pensieri astratti
- 17. Per emottisi si intende ...**
- A. Espettorazione di sangue dalle vie aeree
 - B. Vomito misto a sangue determinato da emorragia dell'apparato gastro-intestinale
 - C. Difficoltà respiratoria che insorge quando l'assistito è supino costringendolo a mettersi seduto
 - D. Il movimento fisico dell'aria verso l'interno e l'esterno dell'albero respiratorio
- 18. Che tipo di precauzioni vanno adottate per un soggetto con meningite da meningococco?**
- A. Droplets
 - B. Contatto
 - C. Nessuna precauzione
 - D. Aerea
- 19. Durante l'esame obiettivo rilevi un'oscillazione involontaria e ritmica degli occhi. Nella documentazione infermieristica definisci ciò come ...**
- A. Nistagmo
 - B. Oculodistrofia
 - C. Oculoparestesia
 - D. Oculodistonia

- 20. La rimozione dello sporco e del materiale organico tramite acqua e detergente, si definisce ...**
- A. Lavaggio
 - B. Decontaminazione
 - C. Disinfezione
 - D. Sterilizzazione
- 21. Durante il posizionamento di una cannula venosa periferica devi pungere la vena ...**
- A. Con un'angolazione compresa fra 20° e 30°
 - B. Con un'angolazione compresa fra 70° e 90°
 - C. Perpendicolarmente al punto di inserzione
 - D. 15 cm circa dal punto di inserzione
- 22. La discrepanza fra il letto vascolare e la volemia con conseguente insufficienza del sangue circolante a riempire completamente il circolo e garantire la perfusione periferica è detta Shock di tipo ...**
- A. Ipovolemico
 - B. Settico
 - C. Cardiogeno
 - D. Anafilattico
- 23. Una pompa infusoria NON va in allarme quando:**
- A. La velocità impostata è errata
 - B. Le batterie sono quasi scariche e il cavo di alimentazione non è collegato
 - C. L'infusione presenta un'occlusione
 - D. La soluzione è terminata
- 24. In caso di convulsione febbrile quale intervento d'urgenza viene solitamente prescritto all'infermiere?**
- A. Somministrare benzodiazepine per via rettale
 - B. Somministrare valium per via endovenosa secondo i dosaggi previsti dal protocollo
 - C. Attendere la risoluzione spontanea della crisi
 - D. Evitare la dispersione di calore con coperte
- 25. Nel caso di somministrazione di un'infusione di Amiodarone in un paziente con una tachicardia sopra-ventricolare, lo stesso farmaco deve essere diluito in quale soluzione:**
- A. Glucosio 5%
 - B. Sodio cloruro 0,9%
 - C. Ringer acetato
 - D. Soluzione elettrolitica pediatrica
- 26. Cosa raccomandano le linee guida rispetto alla preparazione della cute e del sito chirurgico per prevenire le infezioni dello stesso (NICE, 2013)?**
- A. Utilizzare il rasoio elettrico il giorno stesso dell'intervento
 - B. Effettuare una doccia pre-operatoria con antisettico
 - C. Praticare una depilazione manuale di routine
 - D. Fornire al paziente delle garze e suggerirgli l'applicazione di un impacco di iodopovidone
- 27. Quali tra quelle elencate non è una indicazione appropriata per il cateterismo vescicale in base alle più recenti revisioni della letteratura**
- A. Necessità di raccolta urine per esami di laboratorio
 - B. Per ritenzione urinaria acuta o ostruzione urinaria
 - C. Necessità di rilevare con precisione la quantità della diuresi in pazienti critici
 - D. Per favorire la guarigione di lesioni cutanee sacrali o perineali in pazienti incontinenti
- 28. Qual è il corretto significato del termine "pollachiuria"?**
- A. Minzione frequente ma di scarsa entità
 - B. Aumento della diuresi
 - C. Diminuzione della diuresi
 - D. Minzione difficoltosa
- 29. In una persona adulta, sana e a riposo i valori normali della Frequenza Cardiaca (Fc), della Pressione Arteriosa (PA) e della Frequenza Respiratoria sono:**
- A. Fc 60 - 80 bpm; PA 120 / 80 mmHg; Freq. Respiratoria tra 15 - 20 atti/min
 - B. Fc 40 - 50 bpm; PA 120 / 80 mmHg; Freq. Respiratoria tra 40 - 50 atti/min
 - C. Fc 90 - 100 bpm; PA 120 / 80 mmHg; Freq. Respiratoria tra 80 - 90 atti/min
 - D. Fc 20 - 30 bpm; PA 100 / 60 mmHg; Freq. Respiratoria tra 15 - 20 atti/min

30. Il polso, viene rilevato in più sedi tra cui quelle corrispondenti ai seguenti vasi ad eccezione di uno. Quale ?

- A.** Safena
- B.** Femorale
- C.** Pedidia
- D.** Brachiale

