

- 1 **Nel programmare l'assistenza durante il turno di notte quale insieme di attività realizzeresti prioritariamente:**
- A presa visione dei pazienti più complessi; garantire il confort (igiene, posizionamento), eseguire terapie ad orario e assicurare i compiti di riordino
  - B** presa visione dei pazienti più complessi, presa visione degli altri pazienti; garantire il confort (igiene, posizionamento), eseguire terapie ad orario e monitorare i pazienti critici
  - C presa visione e sistemazione di tutti i pazienti ad inizio turno, garantire risposta efficiente alle chiamate dei pazienti; garantire terapie ad orario, garantire i controlli referti e registrazioni
  - D monitoraggio pazienti critici, rispondere alle chiamate dei pazienti, orari distribuzione delle terapie e tempi di posizionamento
- 2 **La scelta del tipo di medicazione in una lesione da decubito deve essere fatta in relazione a:**
- A** profondità della lesione e tipo di tessuto presente
  - B diametro della lesione e localizzazione della lesione
  - C numero totale delle lesioni
  - D diametro della lesione e colore bordi della lesione
- 3 **Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:**
- A prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente
  - B** prima di eseguire procedure invasive
  - C come preparazione alle attività di strumentazione peri-operatoria
  - D al termine delle attività di strumentazione peri-operatoria
- 4 **Nell'accertamento del paziente cardiopatico scompensato si valuta soprattutto la presenza di:**
- A** edemi declivi e turgore delle vene giugulari
  - B poliuria
  - C episodi di ipotensione ortostatica
  - D inversione del ritmo sonno veglia
- 5 **Nella rilevazione della pressione arteriosa mediante sfigmomanometro e fonendoscopio, per la quale sono riconosciute cinque fasi corrispondenti ai toni di Korotkoff, la pressione diastolica viene indicata dalla:**
- A quarta fase
  - B terza fase
  - C** quinta fase
  - D prima fase
- 6 **La pratica della somministrazione di un farmaco include:**
- A** la preparazione, il controllo e la somministrazione, la registrazione di effetti avversi e l'informazione al paziente riguardo il farmaco che sta assumendo
  - B** la preparazione, il controllo e la somministrazione, il monitoraggio dell'efficacia, del trattamento, la registrazione di effetti avversi e l'informazione al paziente riguardo il farmaco che sta assumendo
  - C** la preparazione, il controllo e la somministrazione
  - D** la preparazione, il controllo e la somministrazione, il monitoraggio dell'efficacia, del trattamento e la registrazione di effetti avversi

- 7 **Dividendo il gluteo in quattro quadranti, se si pratica una iniezione intramuscolare nel quadrante superiore esterno è stata scelta la sede:**
- A rettofemorale
  - B deltoide
  - C ventrogluteare
  - D dorsogluteare**
- 8 **Quante compresse da 0,25mg si devono somministrare per ottenere 0,125 mg di dosaggio?**
- A** mezza compressa
  - B due compresse
  - C una compressa più mezza
  - D secondo indicazione medica
- 9 **In caso di emorragia acuta qual è la posizione più idonea da far assumere al paziente?**
- A anti-Trendelenburg
  - B** Trendelenburg
  - C supina
  - D semi-seduta
- 10 **Per l'esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di coltura ematica, il campione deve essere di norma prelevato:**
- A tempestivamente, non appena la temperatura corporea si riporta a 37°C dopo aver superato i 39°C
  - B** durante un episodio di aumento della temperatura corporea
  - C solo se la temperatura corporea supera i 39°C
  - D almeno un'ora dopo un episodio di aumento della temperatura corporea
- 11 **Qual è l'esatto procedimento del prelievo di un campione di urina per l'esame delle urine completo?**
- A invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della seconda minzione del mattino, in un contenitore pulito, non sterile
  - B invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della prima minzione del mattino, in un contenitore pulito, non sterile
  - C** invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore pulito, non necessariamente sterile
  - D invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore necessariamente sterile
- 12 **Durante il servizio notturno in Ortopedia riscontra la caduta di un paziente. Indichi quale sequenza di comportamenti adotterebbe per gestire l'evento:**
- A** allertare il medico, avvisare i familiari, documentare l'evento in cartella, documentare con scheda incident reporting
  - B** soccorrere il paziente, allertare il medico, rivalutare il rischio di caduta, documentare con scheda incident-reporting, avvisare i familiari
  - C** soccorrere il paziente, allertare il medico, avvisare i familiari, documentare l'evento in cartella, rivalutare il rischio di caduta, documentare con scheda incident-reporting
  - D** allertare il medico, soccorrere il paziente, documentare l'evento in cartella, rivalutare il rischio di caduta, documentare con scheda incident reporting

- 13 **La signora Maria è ricoverata in Pneumologia per BPCO riacutizzata. Sta assumendo ossigenoterapia tramite maschera di Venturi con FiO<sub>2</sub> del 32%. In vista dell'assunzione del pasto è previsto il passaggio alla cannula nasale. Quale flusso di ossigeno imposterà l'infermiere con approssimazione all'unità di litro/minuto?**
- A 1 l/m
  - B 3 l/m**
  - C 5 l/m
  - D 6 l/m
- 14 **Durante le manovre di rianimazione cardio polmonare, qual è la giusta sequenza della catena della sopravvivenza ?**
- A** riconoscimento - inizio rcp - attivazione acs - uso dae
  - B riconoscimento - attivazione acs - rcp - uso dae
  - C inizio rcp - uso dae - riconoscimento - attivazione acs
  - D attivazione acs - riconoscimento - inizio rcp - uso dae
- 15 **Qual è tra le seguenti la più importante procedura immediata in un soggetto di 21 anni con asma bronchiale, trattato al domicilio con beta-agonisti, teofillinici e steroidi e.v., perché sintomatico da numerose ore, che si presenta in Pronto Soccorso profusamente sudato, fortemente agitato, incapace di parlare, che ripetutamente si toglie la maschera per l'ossigeno, con ipoventilazione e dispnea debolmente sibilante?**
- A trattamento corticosteroideo sistematico
  - B sodio cromoglicato per via inalatoria
  - C contatto telefonico e discussione con il medico privato per ulteriori notizie anamnestiche
  - D** preparazione per l'intubazione endotracheale
- 16 **Inizio il mio turno in medicina e ho appena preso consegne. Quale dei seguenti pazienti devo sorvegliare per primo?**
- A paziente anziana stabile della quale mi è stato riferito che presenta perdite a livello del catetere vescicale
  - B** paziente di 65 anni, tachicardica, PA 90/55, con una temperatura in salita
  - C paziente di 80 anni, broncopneumopatico, con O<sub>2</sub> a bassi flussi, che satura 91%
  - D paziente con una tracheostomia che necessita di frequenti tracheo-aspirazioni, diuresi contratta
- 17 **I siti per la rilevazione della temperatura corporea centrale sono:**
- A** arteria polmonare, vescica, esofago
  - B vescica, mucosa rettale, cavo orale
  - C vescica, stomaco, arteria radiale
  - D vena cava, vescica, aorta
- 18 **Prima della somministrazione dei farmaci, l'infermiere deve:**
- A** controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere incompatibilità e interazioni
  - B controllare la prescrizione medica e comunicare al direttore sanitario eventuali errori
  - C controllare la prescrizione medica e somministrare i farmaci alla sera
  - D controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere incompatibilità e interazioni, ma solo dei farmaci che sono utilizzati nella struttura di pertinenza

- 19 **Durante la tecnica di iniezione intradermica devi inserire l'ago con un'angolazione ...**
- A compresa fra  $45^\circ$  e  $90^\circ$
  - B di  $30^\circ$
  - C di  $90^\circ$
  - D** compresa fra  $10^\circ$  e  $15^\circ$
- 20 **Devi infondere 300 ml di soluzione di Glucosio al 5% in 10 ore. Non disponi di una pompa di infusione e il deflussore in utilizzo nel reparto presenta questa caratteristica:  
20 gocce = 1 ml. A quante gocce al minuto regoli il deflussore?**
- A 25 gocce/minuto
  - B** 10 gocce/minuto
  - C 20 gocce/minuto
  - D 15 gocce/minuto