

Domanda	Tipologia	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Risposta 5	Risposta corretta
<b>Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il dovere di:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare a cure e prestazioni programmate.	Informarsi sulle prestazioni irrogategli dalla struttura sanitaria.	Portare un cartellino di riconoscimento fornito di foto e nome.	Guarire dalla propria malattia nel minor tempo possibile, per non onerare economicamente l'ente erogatore dei servizi sanitari.		1
<b>Nell'ambito sanitario italiano, l'accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	E' una attività obbligatoria per tutti i soggetti erogatori.	E' una libera scelta dei soggetti erogatori.	E' una attività obbligatoria per le strutture private.	Non è previsto.		1
<b>Il direttore sanitario e il direttore amministrativo di un'Azienda ospedaliera sono nominati:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Dalla Regione.	Dal direttore generale.	Dal consiglio dei sanitari.	Dalla conferenza dei sindaci.		2
<b>La legge 26 febbraio 1999, n. 42 ("Disposizioni in materia di professioni sanitarie"), ha abrogato:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Integralmente il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 (mansionario).	Parzialmente il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 (mansionario), mantenendo in vigore le mansioni previste per la vigilatrice d'infanzia.	Parzialmente il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 (mansionario), mantenendo in vigore le mansioni previste per l'infermiere generico.	Parzialmente il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 (mansionario), mantenendo in vigore le mansioni previste per l'operatore tecnico addetto all'assistenza.		3
<b>Alle qualifiche comunemente indicate come "figure di supporto all'assistenza infermieristica" sono riconducibili:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Solamente l'ausiliario sociosanitario specializzato.	Solamente l'ausiliario sociosanitario specializzato e l'operatore tecnico addetto all'assistenza.	Solamente l'operatore tecnico addetto all'assistenza e l'operatore sociosanitario.	Sia l'ausiliario sociosanitario specializzato, sia l'operatore tecnico addetto all'assistenza, sia l'operatore sociosanitario.		4
<b>Quale norma, fra quelle sotto riportate, indica tre criteri guida per l'esercizio professionale a seguito dell'abolizione del "mansionario"?</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Legge 251/2000.	Legge 42/1999.	Legge 43/2006.	Legge 270/2004.		2
<b>Secondo la NANDA, la costruzione dei concetti diagnostici infermieristici avviene attraverso un modello multiassiale. Quale delle seguenti alternative non è un elemento di questo sistema?</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Giudizio.	Luogo dell'evento.	Età.	Tempo.		2
<b>Il primary nursing, modello organizzativo dell'assistenza infermieristica, prevede:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	La suddivisione del personale infermieristico di una unità operativa in nuclei di 3-4 operatori.	L'assegnazione di un infermiere per ciascun paziente.	La periodica rotazione dei compiti fra gli infermieri di una stessa unità operativa.	La suddivisione dei pazienti secondo il grado di dipendenza.		2

Domanda	Tipologia	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Risposta 5	Risposta corretta
In un piano di assistenza elaborato per un paziente affetto dal morbo di Alzheimer, quale fra le seguenti affermazioni indica la diagnosi infermieristica?	Domanda con 4 risposte multiple	Incapacità di alimentarsi.	Il paziente dimentica di consumare i pasti.	Il paziente è incapace di utilizzare coltello e forchetta.	Il paziente gioca con il cibo.		1
Nella sperimentazione clinica, il "gruppo di controllo" è:	Domanda con 4 risposte multiple	Il gruppo che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione.	Il gruppo di pazienti che costituisce l'intero campione di riferimento.	Il gruppo incaricato dal Comitato etico di supervisionare la ricerca.	Il gruppo che non riceve il trattamento oggetto di sperimentazione.		4
Quanti "assi" strutturano la tassonomia II della NANDA?	Domanda con 4 risposte multiple	Quattro.	Sei.	Sette.	Undici.		3
Nella diagnosi infermieristica "rischio di aspirazione in paziente con depressione del riflesso della tosse":	Domanda con 4 risposte multiple	Il titolo è "rischio di aspirazione".	Il titolo è "depressione del riflesso della tosse".	Il fattore correlato è "depressione del riflesso della tosse".	Il fattore di rischio è "aspirazione".		1
In riferimento al piano assistenziale, la formulazione degli obiettivi deve prevedere:	Domanda con 4 risposte multiple	Il soggetto: l'infermiere.	L'esecutore: l'infermiere.	Il titolo della diagnosi infermieristica.	Il soggetto: il paziente.		4
Nella formulazione dell'obiettivo i criteri:	Domanda con 4 risposte multiple	Sono gli indicatori di processo.	Servono a indicare il livello delle prestazioni infermieristiche e il tempo entro il quale ci si aspetta il raggiungimento dell'obiettivo stesso.	Richiamano il titolo della diagnosi infermieristica.	Descrivono ciò che bisogna attendersi dal paziente.		4
La cianosi si manifesta quando l'emoglobina ridotta è:	Domanda con 4 risposte multiple	Pari a 5 g/dl.	Pari a 10 g/dl.	Pari a 15 g/dl.	Pari a 3 g/dl.		1
Qual è la sede d'elezione per la somministrazione dei farmaci per via intramuscolare in un soggetto adulto?	Domanda con 4 risposte multiple	Ventrogluteale.	Dorsogluteale.	Rettofemorale o vastofemorale.	Dorsoventrale.		1

Domanda	Tipologia	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Risposta 5	Risposta corretta
<b>Per l'esecuzione di una coltura ematica, il campione di sangue deve essere prelevato:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Solo quando la temperatura corporea supera i 39°.	Subito prima o durante l'aumento di temperatura corporea.	Circa un'ora dopo la puntata febbrile.	Ripetutamente dopo la puntata febbrile.		2
<b>Le dimensioni del bracciale dello sfigmomanometro devono essere commisurate:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	All'età del paziente.	Alla statura del paziente.	Alla costituzione fisica del paziente indipendentemente dal sesso.	Al sesso del paziente.		3
<b>Nell'ambito dell'elettrocardiografia uno slivellamento "s-t" è significativo:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Quando supera gli 0,5 mm.	Quando supera 1 mm.	Quando supera i 2 mm.	Se è associato a blocco di branca.		2
<b>Secondo gli ultimi risultati della ricerca, la diagnosi di infezione in una lesione da pressione deve essere:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Esclusivamente microbiologica, attraverso una coltura che evidenzii valori superiori ai 105 CFU/g.	Avallata esclusivamente da una coltura locale e da una sistemica.	Clinica, e avallata in un secondo tempo dalla coltura microbica.	Microbiologica, attraverso tamponi ricavati con la tecnica di striscio circolare all'interno della lesione e sui bordi della stessa.		3
<b>In riferimento alla cateterizzazione vescicale a permanenza, è indicato scegliere cateteri:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Vescicali a tre vie per eseguire lavaggi vescicali in caso di infezioni.	Vescicali a tre vie per eseguire esami urodinamici e culturali in sicurezza.	Vescicali in lattice in caso di cateterizzazioni per lunghi periodi.	In silicone o in siliconato in caso di cateterizzazioni per lunghi periodi.		4
<b>L'obesità ginoide è caratterizzata da:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Concentrazione del tessuto adiposo a livello addominale, toracico e degli arti superiori.	Concentrazione del tessuto adiposo a livello della metà inferiore dell'addome, delle zone glutee e femorali.	Complicanze cardiovascolari e metaboliche.	Complicanze renali e respiratorie.		2
<b>Quale tra le seguenti manovre è corretta relativamente al posizionamento del sondino nasogastrico?</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Stabilire la lunghezza che andrà introdotta misurando dalla fronte all'orecchio.	Iperestendere la testa del paziente per favorire la chiusura della laringe.	Insufflare 40-50 ml di acqua e auscultare con il fonendoscopio la regione epigastrica per controllarne il corretto posizionamento.	Controllo ecografico per valutarne il corretto posizionamento.		4
<b>Nell'assistenza a un paziente con ossigenoterapia non è indicato:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Monitorare la saturazione della bilirubina.	Monitorare il respiro, i parametri vitali, le caratteristiche delle secrezioni.	Garantire un'adeguata igiene orale.	Sorvegliare in modo attento i pazienti affetti da BPCO.		1

Domanda	Tipologia	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Risposta 5	Risposta corretta
<b>La contrazione spasmodica dello sfintere anale con bisogno persistente di defecare e sforzi involontari e inefficaci, è chiamata:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Incontinenza parossistica.	Tenesmo rettale.	Spasmo colico intermittente.	Alvo alterno.		2
<b>I pazienti a rischio di alterazioni della funzione cognitiva dovrebbero essere:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Incoraggiati a muoversi.	Incoraggiati al riposo e alla riflessione.	Sovrastimolati.	Esclusi dal contatto con altre persone.		1
<b>Durante un'aspirazione endotracheale con sondino Nelaton, è corretto:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Sospendere la somministrazione di ossigeno.	Aspirare per almeno 30 secondi.	Aspirare durante la rimozione della sonda.	Aspirare durante l'introduzione della sonda.		3
<b>Per la laparoscopia viene utilizzato:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Azoto.	Ozono.	Anidride carbonica.	Ossigeno.		3
<b>In quale caso è indicato utilizzare le medicazioni a base di idrofibre?</b>	Domanda con 4 risposte multiple	In caso di abbondante essudato.	In caso di ferite ipoessudanti.	In caso di eritemi da eziologia allergica.	in caso di flittene da ustione chiuse.		1
<b>In riferimento alla tecnica del prelievo capillare per l'emoglucotest è indicato:</b>	Domanda con 4 risposte multiple	Utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l'analisi.	Eliminare la prima goccia di sangue e utilizzare la seconda per l'analisi.	Pungere nella parte anteriore del polpastrello del dito.	Pungere dopo aver accuratamente disinfettato con iodopovidone la zona da pungero.		2